



## 優益加® 20億BC益生菌 / 5毫升 口服水劑

BC 益生菌孢子 - 多重抗耐性，  
多種抗生素亦無阻功效，存活性高

### 1. 甚麼是優益加®？

優益加®是一種水劑益生菌產品，蘊含4種常見於腸道的BC益生菌孢子菌株(SIN、O/C、T、N/R)，有助重建腸道益菌平衡，並無致病能力。

### 優益加®的好處

- 存活性高：**BC益生菌孢子可抵抗熱力和胃酸，一般抗生素無阻功效
- 直達腸胃：**特有孢子結構有效通過胃部屏障
- 好菌倍增：**服用後BC益生菌能於腸道內倍增、定殖發揮功效
- 獨立支裝：**方便衛生，可隨時隨地服用

### 健康小知識

益生菌是腸道中的「好」菌，能構成一道天然的抵禦屏障。

### 2. 服用優益加®前有甚麼要注意？

如對BC益生菌孢子過敏，則不應使用本產品。

### 注意事項

如有以下情況，服用本產品前應先徵詢醫生意見：

- 被診斷為免疫系統薄弱(見第4項)
- 早產嬰兒

本產品**只供口服。切勿注射或以其他途徑使用。**

不當使用可引致嚴重過敏性反應，包括過敏性休克。

如正服用抗生素，應於每次服用抗生素之間服用本產品。

如發現產品內有少量微小顆粒，實為BC益生菌孢子簇。此乃正常現象，並不代表產品已受損或變質。服用前先搖均。

### 其他藥物與優益加®

優益加®及其他藥物預計不會產生不良反應或相沖。

### 懷孕與哺乳

如你現正懷孕、可能懷孕、正計劃懷孕或正在哺乳，請在服用本產品前先徵詢醫生或藥劑師意見。

如你現正懷孕或哺乳，應遵照醫生指示並只在有必要時才服用本產品。



### 3. 優益加®服用方法

#### 建議劑量：

初生嬰兒(>1月)及兒童：每天1-2支

成人：每天2-3支

#### 相隔3-4小時服用

可直接服用或加入其他飲品內飲用  
(如水、牛奶、茶或果汁)

服用前搖勻，扭開並移除瓶蓋，擠出水劑服用。



打開瓶蓋後應儘快服用，以免產品變質。

**警告：**除非醫生建議，否則不應服用超過建議劑量。  
如持續不適，或發現最近出現任何徵狀變化，應立即徵詢醫生意見。



### 4. 可能出現的副作用

如出現以下嚴重副作用，應立即向醫生求診：

皮膚或黏膜短時間局部出現腫脹(持續數小時或數天)，部份情況同時會痕癢(血管性水腫)。如發生於臉部、咀唇及喉部，可能會引致吞嚥及呼吸困難。



#### 其他副作用：

機會率未知的副作用(每10,000人中會可能有少於1人受影響)：

- 過敏反應(超敏反應)，包括出皮疹及荨麻疹(風癩)；
- 如於身體防禦功能減弱或患嚴重疾病時服用本產品，血液中可能會有克勞氏芽孢桿菌，引致嚴重血液感染(見第2項)

### 5. 如何儲存優益加®

請將本產品放置於遠離兒童視線及可觸及的地方。

如包裝上所註明的最佳使用期(印於「此日期前最佳」後的日期)已過、產品包裝有破損或儲存不當，請勿服用本產品。

請儲存於30°C以下。

